
Vass3R06s396-400

Vass3R06s396-400

Pina Collection Vassal-Montpellier

3 R6 7 396, 400









## Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 20-3

Code cépage : O Nom introduction:

Code introduction: 1089

Observateur:

Emplacement: 3 R6 A 396-400

## Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9 oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme D- pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5. oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé D oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan(1)- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5, oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absent P - présente 9. oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 9 - présente 9 oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre): nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure nulle ou très faible 1 - faible 3- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure nulle ou très faible ? - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible ? - faible ? - moyenne 5 - forte ? - très forte 9. oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente ? - présente 9.

## Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible (1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [ sinus pétiolaire : ouverture = 1-0-3-4-5-6 / forme = U-agol. - V / dent = oui-ron / dégarni non-parfois-oui ]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

## Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré (1).